DLP 19-03-94000551

AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Edition
Grandes Cultures

REGION CENTRE

BULLETIN TECHNIQUE N° 33

19 NOVEMBRE 1992

MAIS	:	Charbon des Inflorescences : stratégie de lutte pour 1993 et cartographie.
BLE	:	Cicadelles : plus aucun traitement n'est justifié. Pucerons : confirmation de l'absence de risque pour la 2ème vague de semis.
COLZA	:	Charançon du Bourgeon Terminal : nouvelles arrivées.
TREFLE/LUZERNE	:	Sclérotinia du trêfle : sortie continue d'apothécies. Pensez à renouveler le traitement fin Novembre dans les parcelles de trêfle à risque.

– MAIS : CHARBON DES INFLORESCENCES –

Situation :

Ce nouveau charbon est en pleine extension dans notre région : de nouvelles parcelles et communes sont découvertes chaque année.

Pour l'instant, seul le département de l'Eure et Loir ne semble pas encore concerné par ce problème (aucun cas recensé actuellement). La prospection ne pouvant être exhaustive, elle ne peut que sous-estimer les surfaces concernées : la vigilance s'impose dans les communes avoisinant celles où ont été recensées des parcelles contaminées, en particulier dans les zones inondables. En effet, de nombreux foyers se rencontrent le long des cours d'eau.

Rappel : la contamination peut s'effectuer à partir de sols infestés ou de semences non protégées.

STRATEGIE DE LUTTE DU SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX POUR 1993

SENSIBILITE VARIETALE MALADIE REPARTITION CARTOGRAPHIE PV - AGPM	VARIETES TOLERANTES NOTE 0*	VARIETES MOYENNEMENT TOLERANTES NOTE 1 - 2*	VARIETES SENSIBLES NOTE > 2*
ZONE CONTAMINEE SYMPTOMES OBSERVES	CORMAISON F1	STYLOR C STYLOR T 320	STYLOR C ou STYLOR T 320 + ATOUT
ZONE SANS SYMPTOMES OBSERVES	STYLOR C - STYLOR T CORMAISON X CORMAISON TX VITAVAX 200 FF	STYLOR C ou STYLOR T 320	

* Consulter les listes publiées par l'A.G.P.M.

- Recommandations :

Les variétés très sensibles, dont la note est supérieure à 10, ne sont à retenir que si elles sont très intéressantes sur le plan agronomique.



Publication périodique

ABONNEMENT ANNUEL : 240 F

Ministère de l'Agriculture et de la Forêt
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
BP 210 - 93, rue de Curambourg
45403 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
Tél. 38.86.36.24
FAX 38.84.19.79




759

CARTOGRAPHIE CHARBON DES INFLORESCENCES

SITUATION EN 1992

RESULTATS DES PROSPECTIONS 90/91/92



PROSPECTION 1992 - SRPV CENTRE -

DEPARTEMENTS	NOMBRE DE PARCELLES PROSPECTEES	PARCELLES DE SEMENCES*	PARCELLES TOUCHEES
37	231	58	41
18	26	-	13
36	15	-	5
45	11	-	4
41	12	-	2

* Toutes les parcelles visitées avaient été protégées et ne présentaient pas de symptômes en 1992.

- BLE -

CICADELLES :

CAPTURES DE PSAMMOTETTIX EN CUVETTES JAUNES :

LOIRET réseau SRPV	14 au 21/10	21 au 28/10	28 au 02/11	02 au 09/11	09 au 16/11
FLEURY 3 cuvettes	12	12	5	3	1
MEUNG/LOIRE 4 cuvettes	92	27	6	13	2
VIENNE EN V. 5 cuvettes	18	16	20	4	0
VARENNES 2 cuvettes	2	2	3	1	0
LA SELLE/B 5 cuvettes	44	7	5	2	0

EURE ET LOIR CA et SRPV	14 au 21/10	21 au 28/10	28 au 03/11	03 au 10/11	10 au 17/11
MONTIGNY *	68	1	19	12	1
BONNEVAL *	1	0	0	0	0
CHARTRES 2 cuvettes	5	1	0	0	0
BROU *	0	0	0	0	0
CHAUDON *	0	0	-	0	0

LOIR ET CHER GDA / SRPV	19 au 26/10	26 au 02/11	02 au 09/11	09 au 16/11
LUNAY * - repousses	29	22	21	5
- blé*				0
MARCHENOIR*	10	1	0	2
BUSLOUP 2 cuvettes	8	0	3	0
ST OUEN 2 cuvettes	5	1	2	0

CHER AGRICHER/AGRISHELL	20 au 27/10	27 au 03/11	03 au 10/11	10 au 17/11
VORNAY 4 cuvettes	12	5	1	0
MEHUN / Y *	5	9	2	0
NERONDES *	7	5	5	0
ST JUST *	14	35	0	0
ST MICHEL DE VOLANG. - repousses *	4	7	0	0
HENRICHEMONT *	1	2	2	0
MERY ES BOIS *	3	0	5	
BREVIANDES - blé*	0	1	2	0
- jachères*		21	12	
DAMPIERRE EN CROT*	3	2	6	
BEAULIEU-BONNY/L *	0	2	4	
SENS BEAUJEU			16	0
LA CHAPELLE MTLINARD - jachères *		2	0	
CHAUMOUX-MARCILLY - jachères *		11	1	
SANCERGUES *		1	1	
OIZON - BLANCAFORT 2 cuvettes	0	0	22	0
LEVET *		4	10	0
ENNORDRES *			14	0
NEUVY 2 CLOCHERS *			8	0
CHAUMES (58)			9	0
MAGNY-COURS (58)			0	

INDRE réseau ITCF	20 au 27/10	27 au 03/11	03 au 10/11	10 au 17/11
CHOUDAY * - sol nu, semis puis jeunes levées	0	0	4	2
- jachères * (repousses)	10	11	20	0
AVAIL * sol nu	4	0	2	0

INDRE réseau SRPV	21 au 28/10	28 au 03/11	03 au 10/11	10 au 17/11
NEUVY PAILLOUX* repousses blé	4	2	3	0

INDRE ET LOIRE Ets CATIN/SRPV	23 au 02/11	02 au 09/11	09 au 16/11
LIGNE *	4	7	
ASSAY *	19	15	
POUANT (orge)*		5	

* une cuvette par poste

P 60

Une légère activité a eu lieu les 5 et 6 Novembre, de nombreuses cicadelles vertes (non dangereuses) et quelques Psammotettix (cicadelles brunes) ont été observées.

Depuis, les pluies ont accéléré la diminution des populations. Les captures sont quasiment nulles sur tous les secteurs cette dernière semaine (voir tableaux).

Aucune intervention n'est désormais justifiée.

PUCERONS :

La deuxième vague de semis (levée à partir de début Novembre) est très peu exposée au risque JNO. En effet, les vols enregistrés à la tour à succion sont quasiment nuls depuis le 25 Octobre.

L'expérimentation pot piège confirme également ce faible risque : pas de puceron sur les pots depuis le 20 Octobre et absence de pots positifs au virus de la JNO.

Par contre, des pucerons ont été observés sur des semis précoces en Indre et Loire dans le secteur de Richelieu (certaines parcelles atteignent le seuil de traitement de "1 pied sur 10 porteur de pucerons"). Soyez vigilants sur les semis précoces non protégés de cette région.

– COLZA –

CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL :

De nouvelles arrivées de ce ravageur se sont produites du 5 au 7 Novembre. Ces insectes sont prêts à pondre actuellement.

Les captures sont variables selon les secteurs :

Captures du réseau S.R.P.V. CENTRE :

CHER :

RIANS	1
CIVRAY	1

INDRE :

VOUILLON	1
ARDENTES	2

INDRE ET LOIRE :

REUGNY	3

LOIRET :

GY LES NONAINS	4
CHATILLON COLLIGNY	2
FEROLLES	1

Captures du réseau AGRICHER (18) :

OIZON 2 cuvettes	3
MERY ES BOIS 2 cuvettes	12
IVOY LE PRE	3
BREVIANDE	20
HENRICHEMONT	0

Quelques captures à SANCERGUES, VORNAY, CHAUMOUX et MEHUN/YEVRE.

Il faut rappeler qu'il n'y a pas de relation entre "nombre de captures en cuvette jaune et dégâts". Aussi, même si les captures sont faibles (de l'ordre de quelques individus seulement), des dégâts peuvent avoir lieu en sortie d'hiver.

D'autre part, plus les colzas sont développés, plus la ponte risque de se situer près du bourgeon terminal et donc plus les dégâts risquent d'être importants.

Les parcelles qui présentent une faible densité de pieds sont davantage concernés par la nuisibilité de ce ravageur et une intervention pourrait être bénéfique.

Cependant, compte tenu des conditions difficiles pour pénétrer dans les parcelles et réaliser une intervention dans les secteurs concernés par les captures, des sondages larvaires seront réalisés, comme tous les ans, courant Janvier. Ils permettront de quantifier les pontes, d'estimer le risque de dégâts et de raisonner une intervention éventuelle de rattrapage.

* * *
* *
*